

平成28年熊本地震による感染症に関するリスクアセスメント表(2016年4月28日現在)

注) 更新部分を赤字に示す

	地域・避難所で流行する可能性 1. 低、2. 中、3. 高	公衆衛生上の重要性 (罹患率・致命率・社会的影響) 1. 低、2. 中、3. 高	リスク評価 1. 低、2. 中、3. 高	コメント(症状が出現した際は速やかに申告するよう避難者、支援者含めすべての避難所関係者に周知する)
避難所の過密状態に伴う感染症				
急性呼吸器感染症	3	2	3	避難所での過密状態が継続すれば発生リスクが高まる。気温・湿度の変動も病原体伝播・避難者の体調に影響する。レジオネラ感染症はヒートショックのリスクは極めて低いが、がれき撤去等の作業に伴い発生するリスクがある。 <b>引き続き手指衛生や咳エチケットを徹底する。</b>
インフルエンザ/インフルエンザ様疾患	3	2	3	全国的には活動性は低下傾向であるが、一部の避難所内でインフルエンザの発生があり、 <b>注意が必要である。</b>
結核*	1	2	1	発生リスクは必ずしも高くないが、咳が2週間以上続く場合には鑑別が必要である。治療中の避難者の場合は、 <b>確実な服薬継続が重要である。</b>
水系/食品媒介性感染症				
感染性胃腸炎/急性下痢症(黄色ブドウ球菌・サルモネラ・カンピロバクター・病原性大腸菌・ノロウイルス・ロタウイルスなど)	3	2	3	避難所でノロウイルス感染者の発生が報告されており、避難所における感染性胃腸炎の発生および感染拡大のリスクは高い。 <b>トイレの使用後、調理前、食事前、避難所に入出入りする際に個人の手指衛生対策強化に加えて、避難所等における食品衛生管理の強化、トイレの衛生状態の保持が重要である。</b>
野外活動等で注意する感染症				
創傷関連皮膚・軟部組織感染症	2	3	3	がれき撤去等の活動に伴う受傷による破傷風や皮膚感染症発生の可能性がある。発症のおそれがある患者の予防処置としては、必要に応じて破傷風トキソイドの接種が行われる。
節足動物等の媒介による感染症	1	2	1	<b>ダニの活動期に入っているため、ツツガムシ、日本紅斑熱、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)などのダニ媒介性感染症の発生の可能性があり、発熱患者には屋外での行動歴や刺し口の有無を確認する。</b>
ワクチンで防ぐことのできる感染症				
破傷風	2	3	3	外傷後、泥流や土壌曝露後に感染しうる。がれきや泥の撤去作業時にもリスクがあるため、発症のおそれがある患者の予防処置としては、必要に応じて破傷風トキソイドの接種が行われる。
麻疹(はしか)	1	3	2	輸入例等により持ち込まれ、また避難所に感受性者(乳幼児等やワクチン未接種者等)が居住する場合、重症かつ空気感染により伝播する麻疹は常に最大級の警戒をする必要がある。麻疹様症状を呈する者が認められた場合には速やかな隔離が必要である。
風疹	2	2	2	避難所での発生があると、ワクチン未接種の成人を中心に感染伝播する可能性がある。妊娠初期の感染は先天性風しん症候群のリスクがある。(妊娠中の風しんワクチン接種は禁忌)
ムンプス(おたふくかぜ)	2	2	2	<b>集団の感受性によっては注意を要する。地域によっては発災前に流行が見られており、避難所での発症や感染に注意する。</b>
水痘(みずぼうそう)	2	2	2	水痘の発生は低いレベルに維持されているが、空気感染により伝播することから避難所において症例が探知された場合には速やかに適切な対応をとる。
百日咳	2	2	2	百日咳様症状(持続的な乾性咳嗽や笛声咳嗽等)を認めた際には医療機関への相談等が必要である。
肺炎球菌感染症	1	2	1	東日本大震災において発災直後から3週間程度の間には肺炎球菌性肺炎が多発している。
その他				
体液を介して感染する疾患(B型肝炎/C型肝炎/HIV)	1	2	1	
細菌性髄膜炎、ウイルス性髄膜炎	1	2	1	

\*被災直後よりも避難所での滞在が長期になった場合に問題となる