

本文書では、国内外の保健機関や研究機関が発表した公式文書に基づいた情報が記載されています。そのため、報道機関向け会見等での発表情報は含まれていません。  
国内外の保健機関や研究者が調査中のため、本文書の公開日から情報が大きく更新されている可能性があります。最新の情報をご確認ください。

## 複数国で報告されているエムポックスについて (第6報)

2023年11月8日時点  
国立感染症研究所

### 概要

- 2022年5月以降、欧米を中心に、これまでエムポックスの流行が報告されてきたアフリカ大陸の国々(以下、常在国)への渡航歴のない症例が報告されており、2022年7月23日に世界保健機関(WHO)事務局長は今回のエムポックスの流行が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当すると宣言した。各国における対策により世界的な報告数が減少したことから、2023年5月11日に今回の流行がPHEICに該当しない状態になった旨が宣言された。
- 2022年1月1日以降、2023年9月30日までに世界で90,000例以上の症例と157例の死亡例が報告された。欧米を中心とした流行はピークを越えたが、世界的に報告は継続しており、特に2023年3月以降東アジア、東南アジアからの報告が増加している。
- エムポックスは小児、女性の感染例の報告もあり、誰でも感染するリスクのある疾患ではあるが、2022年5月以降常在国外で報告されている症例の多くは男性であり、男性間で性交渉を行う者(MSM; men who have sex with men)が多く含まれていることが各国から報告されている。また、エムポックスは多くは自然軽快するが、小児や妊婦、免疫不全者で重症となる場合がある。
- エムポックスは、感染者の皮膚病変や近接した対面での呼吸器飛沫への一定時間以上の曝露(prolonged face-to-face contact in close proximity)、感染者が使用した寝具等の媒介物(fomite)により伝播することが知られてきた。今回の流行における一連の報告では、感染者に見られた病変の部位などから、性的接触に伴う伝播が中心となっている可能性が指摘されている。

- 2023年10月2日現在、日本国内においては208例が報告されている。当初は本人の海外渡航歴、あるいは海外渡航歴のある者との接触が確認されていたが、2022年38週以降は海外渡航との関連がない症例が主体である。
- エムボックスに類似する発疹等の症状がある場合は速やかに医療機関に相談することが望ましい。特に次のような者は、発疹の出現や体調に注意を払うことが望ましい。
  - エムボックスの患者または疑い例の者との接触のあった者
  - 複数または不特定多数との性的接触があった者
- エムボックスは誰にでも感染するリスクのある感染症である。特定の集団や感染者、感染の疑いのある者等に対する差別や偏見は、人権の侵害につながる。さらに、受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を遅らせる原因となる可能性がある。客観的な情報に基づき、先入観を排した判断と行動がなされるべきである。

## 第5報からの変更点

- 国内外での発生状況の更新
- 治療薬、ワクチンに関する知見の更新
- 国内における対策の更新

## 目次

- 従来のエムボックスについて
- 国外の状況
- 国内の状況
- 国内における対策
- ワクチンについて
- 治療薬について
- 動物におけるエムボックス

## 従来のエムポックスについて

- エムポックスは、モンキーポックスウイルス(別名 エムポックスウイルス、以後エムポックスウイルスと表記)感染による急性発疹性疾患である。感染症法では4類感染症に位置付けられている。2022年の流行以前は、主にアフリカ中央部から西部にかけて発生しており、自然宿主はアフリカに生息するげっ歯類が疑われているが、現時点では不明である。潜伏期間は通常6~13日(5~21日)とされる。症状は発熱と発疹を主体とし、多くは2~4週間で自然に回復するが、小児等で重症化、死亡した症例の報告もある。また、一般に皮膚病変が治癒し、落屑するまでの間が他者への感染性がある期間とされる。詳細については[国立感染症研究所「エムポックスとは」\(国立感染症研究所, 2022b\)](#)を参照のこと。なお、2022年から主に従来の流行地外で発生しているエムポックスは、症状や主たる患者層が従来の知見とは異なることから、以降の記載を参照すること。

## 国外の状況

- 2022年5月7日以降、2023年9月30日時点で90,000例以上のエムポックス患者の報告がある。2022年8月をピークに世界全体での報告数は減少したが、2023年3月以降アジアからの報告が増加している。

2022年5月7日に、英国は、常在国であるナイジェリア渡航後のエムポックス患者の発生を報告した。以降、欧米を中心に、常在国への渡航歴や患者への接触歴のないエムポックス症例が報告されている。世界保健機関(WHO)は7月21日にエムポックスに関する2回目の国際保健規則(IHR)緊急委員会を開催し、IHRに基づく「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当するか議論を行なった。緊急委員会の意見をふまえ、7月23日にWHO事務局長は今回のエムポックスの流行がPHEICに該当すると宣言した(WHO, 2022a)。

その後、各国で患者の早期発見と疫学調査、治療薬やワクチンの導入、啓発活動といった対策が実施されたこと、世界的な報告数の減少がみられたこと、また、重症度や臨床症状の傾向に変化が見られないことから、2023年5月11日にWHO事務局長がPHEICに該当しないことを宣言した。(WHO, 2023b)。2023年8月21日、WHOはIHRに基づく恒常的勧告を発出し、ヒトからヒトへの感染伝播の排除を目指し、継続した対策の実施を求めている(WHO, 2023c)。

2023年9月30日時点で、WHOに加盟している常在国を含む115の国と地域から、2022年1月1日以降に診断された91,091例の確定症例が報告されている(WHO, 2023a)。地域別には、南北アメリカ59,949例(65.8%)、欧州26,231例(28.8%)と欧米から多く報告されているが、これらの地域からの確定症例数の報告は

2022年8月をピークに減少しており、欧州疾病予防管理センター(ECDC)や米国の疾病管理予防センター(CDC)が、行動変容、高リスクグループの中での免疫形成、ワクチン接種など、複数の要因が影響している可能性を指摘している(CDC, 2022c, ECDC, 2023, Zhang XS, 2023)。

一方で東アジア、東南アジア諸国からの報告が2023年3月頃から増加しており、直近1か月ではWHO西太平洋地域からの報告が最も多かった。また、中国、韓国、タイ、ベトナム、インドネシアなどで患者数の増加がみられるほか、自国内で感染したと想定される患者の報告がある(WHO, 2023a, China CDC, 2023, KCDA, 2023, Thailand MoPH, 2023a, Thailand MoPH, 2023b, Vietnam MOH, 2023, KEMENTERIAN KESEHATAN, 2023)。

- **症例の多くは若年男性で、患者との直接的な接触による感染が疑われている。**

エムポックスは、ヒトからヒトへの感染の場合、患者の皮膚病変や近接した対面での呼吸器飛沫への一定時間以上の曝露(prolonged face-to-face contact in close proximity)、患者が使用した寝具等の媒介物(fomite)により伝播することが知られている。患者の皮膚病変のほか、血液、肛門、咽頭、尿などからエムポックスウイルスが検出され、特に皮膚病変、肛門からの検体がほかの部位と比較してウイルスDNA量が多いことが報告されている(Colavita F, 2022)。また、発症19日後の患者の精液からエムポックスウイルスが分離された報告(Lapa D, 2022)や、発症54日後の精液からエムポックスウイルスのDNAが検出された報告などがあり、精液を介した感染の可能性が示唆されている一方で、77例から採取した検体で発症15日後の精液の99%でウイルス培養が陰性であったとの報告もあり(Suner D, 2023)、精液中のウイルスの感染性を有する期間については不明である。その他の部位からも、発症40日後の穿破したリンパ節、54日後と76日後の唾液からエムポックスウイルスのDNAが検出された報告があるが、感染性は不明である(Pettke A, 2022)。

また、発症前の患者から複製可能なウイルスが検出された報告(Brosius I, 2023)、発症間隔が潜伏期間より短いと推定されたとする報告(Ward T, 2022)、発症前の感染者との濃厚接触を通じた感染例の報告(Kubo T, 2023)があり、発症前のエムポックス患者から感染伝播した可能性が示唆されている。

今回の流行で報告された症例の多くは男性であり、男性間で性交渉を行う者(MSM)が多く含まれていることが各国から報告されている。性別情報が得られた症例のうち、96.3%(82,158例/85,286例)は男性であり、年齢の中央値は34歳(四分位範囲: 29-41歳)であった。18歳未満の症例は1.3%(1,148例/88,404例)であり、333例が5歳未満であった。性的指向(sexual orientation)の情報が得られた確定症例のうち、83.2%(28,387例/34,124例)がMSMであった。また、感染経路の判明し

ているもののうち、82.5%(18,108 例/21,938 例)が性的接触であった。医療従事者の症例も 1,302 例報告されているが、ほとんどは医療機関外での感染であった(WHO, 2023a)。陰部病変を有する MSM における性的接触での伝播が示唆されており、性的な関係のネットワークで相互につながるコミュニティの一部にエムポックスが入った可能性があることが指摘されている(ECDC, 2022a)。

ただし、海外渡航歴はあるものの感染経路不明の小児例の報告(van Furth AMT, 2022)や小児の家庭内感染の報告(Del Giudice P, 2023, Nemechek K, 2023)、保健医療従事者の接触(fomite)感染(Salvato RS, 2022)、医療従事者の針刺し事故での感染の報告(Carvalho LB, 2022)、ピアスやタトゥーの施術施設で消毒が不十分な器具を介したと考えられる利用者間の感染伝播の報告(del Rio Garcia V, 2022)もあり、性的接触以外での感染についても注意が必要である。

- 常在国外で報告されている症例については、これまでに知られているエムポックスの症状の特徴とは異なる所見があることが報告されており、注意が必要である。

2 つ以上の症状を報告した国から報告された、1 つ以上の症状を有する 37,485 例のうち、発疹が 33,837 例(90.3%)と最も多くみられ、発熱は 21,811 例(58.2%)でみられた。発疹の中では全身性の発疹の報告が 21,007 例(56.0%)、性器周辺の発疹は 18,978 例(50.6%)にみられた。また、リンパ節腫脹は 11,132 例(29.7%)でみられた(WHO, 2023a)。その他合併症として、脳炎、心筋炎、関節炎、眼病変などが報告されている(Badenoch JB, 2022, Rodriguez-Nava G, 2022, Fonti M, 2022, Badillo-Paulina R, 2023)。入院の有無が判明した症例のうち 77.5%(4,202 例/54,189 例)が隔離または治療のために入院していた(WHO, 2023a)。入院の理由として、重度の肛門直腸痛、皮膚病変のほか、心筋炎、急性腎障害、食事摂取困難なほどの咽頭痛などが報告されている(Thornhill JP, 2022)。また、HIV のコントロールが良好な HIV 感染者は、非 HIV 感染者と同様の臨床経過をたどる可能性が指摘されている(Vivancos-Gallego MJ, 2022)一方で、HIV コントロール不良の患者では、重症例(Miller MJ, 2022)や、長期にウイルスが排泄されたとする報告がある(Pinnetti C, 2023)。

今回の流行では、発疹は全身症状に先行して出現し、初期の小水疱から痂皮化したものまで様々なステージのものが非同期的に見られたこと(Antinori A, 2022, Duque MP, 2022, Hammerschlag Y, 2022,) など、過去の報告との違いが指摘されている。加えて、エムポックスを疑う症状のない者の直腸肛門検体からエムポックスウイルスが検出されたと報告されており(De Baetselier I, 2022)、日本からも、エムポックスを疑う症状のない MSM1,346 人を対象とした観察研究で、観察期間中無症状であった 3 例の PCR 陽性例が含まれていたと報告されている(Mizushima D, 2023)など、無症候

性病病原体保有者の存在も明らかとなっている。ただし、無症候性病原体保有者が感染源となっているという直接的な証拠はなく、引き続き知見の収集が必要である(CDC, 2022b)。

- **常在国外を含め死亡例の報告がある。**

2022年1月1日から2023年9月30日の期間で157例の死亡例が報告された。地域別にはアメリカ地域127例、アフリカ地域20例、ヨーロッパ地域7例、東地中海地域1例、南東アジア地域2例の死亡例が報告されている(WHO, 2023a)。

- **確定診断されている事例からはクレード IIb のウイルスが検出されており、全ゲノム解析の結果では近縁のウイルスが多く検出されている。**

近年、感染症や病原体等の命名は、偏見防止のために地理的な名称を用いない配慮がなされており、今回の流行中にエムポックスウイルスのコンゴ盆地系統群をクレード I、西アフリカ系統群をクレード II とし、クレード II にサブクレードとして IIa、IIb を設ける名称変更がされ(WHO, 2022c)、また monkeypox としていた疾患の名称について、1年間の移行期間を経たうえで mpox へ変更することが決定された(WHO, 2022f)。日本においても政令改正を経て、2023年5月26日に感染症法上の名称が、「サル痘」から「エムポックス」に変更された(厚生労働省, 2023a、厚生労働省, 2023b)。

クレード II は、中央アフリカで主に流行するクレード I と比較して重症化しにくく、またヒトからヒトへの伝播性が低いとされる。今回の常在国外での発生と関連している系統からの分離株の多くがクレード II のうちクレード IIb の B.1 系統とその亜系統に属している(WHO, 2023a)。これらの株は2018年に英国、イスラエル、シンガポール、ナイジェリアで解析されたウイルスと近縁であり、当時検出されたウイルスから約50塩基の変異がみられたことから、想定されるエムポックスウイルスの変異の速度より速く変異が起きていることが示唆された。しかし、多くの変異が加わった原因や、変異が流行の動態に影響を与えているかは不明である(Isidro J, 2022)。

## 国内の状況

- **2023年10月6日時点で、国内では208例が探知されている。**

エムポックスは、感染症法上で4類感染症に位置付けられており、患者もしくは無症状病原体保有者を診断した医師、感染死亡者及び感染死亡疑い者の死体を検案した医師は、ただちに最寄りの保健所への届出を行う必要がある。

2022年7月25日に、欧州でその後エムポックスと診断された者と接触した後、帰国後に発症した東京在住の成人男性が、エムポックスと診断された(厚生労働省,

2022a)。

2023年10月6日時点で、国内では208例が探知されている。

症例はすべて男性であり、19都府県で探知された。居住自治体別の探知数は多い順に、東京都131例、神奈川県18例、大阪府15例、埼玉県11例、千葉県9例となっており、その他茨城県、群馬県、山梨県、静岡県、愛知県、京都府、兵庫県、奈良県、広島県、徳島県、香川県、高知県、鹿児島県、沖縄県からの報告があった。これまで感染症発生動向調査に基づく届出及び保健所による疫学調査では、国内の症例において死亡例は探知されていない。症状については、発疹が186例(89.4%)にみられ、発熱が153例(73.6%)、リンパ節腫脹が71例(34.1%)でみられた。海外渡航歴のない症例が193例(93%)であり、特に2022年38週以降は海外渡航歴のない症例が主体である(厚生労働省, 2022a)。

図1. 発症週別エムポックス探知数 2022年5月2日～2023年10月1日(疫学週2022年第18週～2023年第39週)(n=200 無症状病原体保有者5名、発症日不明者3名を除く. 2023年10月6日集計時点)




表 1. エムポックス探知例の特徴 2022 年 5 月 2 日～2023 年 10 月 1 日(疫学週 2022 年第 18 週～2023 年第 39 週)(n=208 2023 年 10 月 6 日集計時点)

|                       | 項目     | 人数  | 割合    |
|-----------------------|--------|-----|-------|
| 性別                    | 男性     | 208 | 100%  |
| 年代                    | 20 代以下 | 32  | 15.4% |
|                       | 30 代   | 75  | 36.1% |
|                       | 40 代   | 85  | 40.9% |
|                       | 50 代以上 | 16  | 7.7%  |
| 症状                    | あり     | 203 | 97.6% |
|                       | 発疹     | 186 | 89.4% |
|                       | 発熱     | 153 | 73.6% |
|                       | リンパ節腫脹 | 71  | 34.1% |
|                       | 肛門直腸痛  | 44  | 21.2% |
|                       | 倦怠感    | 40  | 19.2% |
|                       | なし     | 5   | 2.4%  |
| 感染経路(推定・確定)           | 接触感染   | 198 | 95.2% |
| 発症前 21 日間の性的接触        | あり     | 151 | 72.6% |
| HIV 罹患 <sup>†</sup>   | あり     | 84  | 60.0% |
| STI の既往歴 <sup>†</sup> | あり     | 117 | 83.6% |
| うち梅毒の既往歴 <sup>†</sup> | あり     | 63  | 45.0% |
| 転帰 <sup>†</sup>       | 死亡     | 0   | 0.0%  |

<sup>†</sup>届出及び保健所による疫学調査により把握された情報に基づく。(n=140 不明もしくは 2023 年 10 月 6 日時点で情報のない 68 例除く)

- 国内の症例においても、性的接触による感染の可能性が示唆される。

2023 年 10 月 6 日時点で確認されている症例 208 例のすべてが男性であり、そのうち 198 例(95.2%)において推定・確定される感染経路として接触感染があったことが確認されている。また、151 例(72.6%)において発症前 21 日間に性的接触があったことが把握された。

海外における報告と同様に、国内においても男性同士の性的接触による感染伝播が中心となっている可能性が示唆される。

これらの状況から厚生労働省は、より一層、国内外の発生動向等に注意する必要があるとして、2022 年 5 月 20 日に発出した地方自治体への、注意喚起と情報提供への協力依頼(令和 4 年 5 月 20 日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「サル痘に関する情報提供及び協力依頼について」)を改正し、再度の周知徹底を促した(令和 5 年 5 月



26 日最終改正)。

なお、感染症法に基づき届出られたエムポックスの直近の報告数においては、[感染症発生動向調査週報\(IDWR\)](#)を参照のこと。

## 国内における対策

- **早期の患者発見と積極的疫学調査、検査体制の構築**

エムポックスに対する公衆衛生対応として、ヒトからヒトへの感染連鎖を断つために、引き続きサーベイランス体制の強化が推奨されており(WHO, 2023c)、厚生労働省は、2022年5月20日に地方自治体に対し、注意喚起と情報提供への協力依頼を行っている(厚生労働省, 2022a)。今回の常在国外の発生ではその疫学的動向が既知の知見と異なっていることから、迅速に積極的疫学調査を行うことが求められる。実施要領については、事務連絡(厚生労働省, 2022a)に示されている。また、今般の流行の疫学的知見を踏まえ、厚生労働省は、2022年8月10日に感染症法に基づくエムポックスの届出基準の改正を行った(厚生労働省, 2022b)。エムポックスに類似する発疹等の症状がある場合は速やかに医療機関に相談することが望ましい。特に以下の者は、皮疹の出現がないか等、体調の変化に注意を払うことが重要である。疑い例に関する暫定症例定義が事務連絡に示されている(厚生労働省, 2022a)。

以下の①、②を満たす者とするが、臨床的にエムポックスを疑うに足るとして主治医が判断をした場合については、この限りではない。

① 少なくとも次の1つ以上の症状を呈している

- ・説明困難な急性発疹(皮疹または粘膜疹)
- ・発熱
- ・頭痛
- ・背中痛み
- ・重度の脱力感
- ・リンパ節腫脹
- ・筋肉痛
- ・倦怠感
- ・咽頭痛
- ・肛門直腸痛
- ・その他の皮膚粘膜病変

② 以下のいずれかに該当する

- ・発症 21 日以内に複数または不特定の者と性的接触があった

- ・発症 21 日以内にエムポックスの患者、無症候性病原体保有者又は①を満たす者との接触(表. レベル中以上)があった
- ・臨床的にエムポックスを疑うに足るとして主治医が判断した

表 2. 接触状況による感染リスクのレベル

|                   |    | エムポックス患者等との接触の状況 |                 |                 |                         |            |
|-------------------|----|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------|
|                   |    | 創傷などを含む粘膜との接触    | 寝食を共にする家族や同居人   | 正常な皮膚のみとの接触     | 1m 以内の接触歴 <sup>3)</sup> | 1m を超える接触歴 |
| 適切な PPE の着用や感染予防策 | なし | 高 <sup>1)</sup>  | 高 <sup>2)</sup> | 中 <sup>1)</sup> | 中                       | 低          |
|                   | あり | —                | —               | —               | 低                       | 低          |

- 1) 動物におけるエムポックスの感染伝播が見られる国でのげっ歯類との接触を含む
- 2) 寝具やタオルの共有や、清掃・洗濯の際の、確定例の体液が付着した寝具・洋服等との接触を含む
- 3) 接触時間や会話の有無等周辺の環境や接触の状況等個々の状況から感染性を総合的に判断すること

また、国内においてエムポックス疑い例に対して迅速に確定診断のための検査を実施できる体制が整えられている。病原体検査のために必要な検体採取、保存方法については、事務連絡(厚生労働省, 2022a)に示されている。

#### ● エムポックスの患者等への注意事項

皮疹が完全に治癒し、落屑するまでの間(概ね 21 日程度)は周囲のヒトや動物に感染させる可能性があるため、感染者はヒトやペットの哺乳類との接触を避けるべきである。また、小児や妊婦、免疫不全者との密な接触も避けるべきである。また、性的接触についてはすべての皮疹が消失してから原則 8 週間は避けるべきである。

接触者についても、接触後 21 日間は症状が出ないか注意し、発症時には速やかにヒトやペットの哺乳類との接触を避け、医療機関を受診することが求められる。また、症状が出ていない場合でも、小児や妊婦、免疫不全者との密な接触や、性的接触をできる限り控えるべきである。

エムポックスの患者又は疑いとされた方は当面の間、献血は控えるよう厚生労働省から示されている。また接触者は、接触後 21 日間は献血を避けるべきである(厚生労働省, 2022c、日本赤十字社, 2022)。

推奨される感染予防策については、「[エムポックス患者とエムポックス疑い例への感染予防策](#)」(国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター, 2022)を参照のこと。

感染者が飼育しているペットに関して、感染者が発症後にペットと接触していない場合、

自宅外で世話をしてもらうように知人など依頼し、回復後に自宅を消毒してから自宅に戻すことが推奨される。また、感染者が発症後にペットと接触した場合は、そのペットは、最終接触から 21 日間、ヒトや他の哺乳類との接触を避けることが推奨される。感染者が自宅でペットの世話をする場合は皮疹を覆い、サージカルマスクを着用することが推奨される。一方で、ペットがエムボックスに感染した可能性がある場合、ケージなどにいれて隔離し、接触する場合は手袋、サージカルマスク、目の防護具、ガウンの着用が推奨される。

- **臨床的対応体制の構築**

- ▶ 診療指針について

今般の流行における臨床徴候の詳細については、国立国際医療研究センター国際感染症センター「[エムボックス\(Mpox\)の診療指針 ver. 2.1](#)」を参照のこと。

- ▶ ワクチン、治療薬について

ワクチンについては、痘そうワクチンである LC16 ワクチンのエムボックスへの適応追加が 2022 年 8 月 2 日に承認された。日本国内においてエムボックスに対して承認された治療薬はない。なお、欧州・米国等で承認されている天然痘治療薬が治療に有効であることが示唆されている。

以下のとおり、エムボックスの患者への治療薬の投与、接触者へのワクチン接種に関する臨床研究を実施している。

- ・[国内で発生したエムボックスの患者に対して Tecovirimat を投与し、安全性・有効性を評価する介入研究](#)

- ・[国内で発生したエムボックスの患者に対してワクシニア免疫グロブリンを投与し、安全性・有効性を評価する観察研究](#)

- ・[エムボックス予防における痘そうワクチンの有効性及び安全性を検討する観察研究](#)

患者又は接触者が本臨床研究の要件に合致し、当該者が臨床研究に関する説明を受け合意した場合には臨床研究に参加することが可能である。

また、2023 年 6 月 1 日から、[高リスク者に対して痘そうワクチンを接種し、安全性・有効性を評価する介入研究](#)が実施されている(被験者登録機関は 2023 年 10 月 6 日まで)。

- **リスクコミュニケーションとコミュニティアウトリーチ活動**

リスクコミュニケーションとコミュニティアウトリーチ活動は、重要な感染症アウトブレイク対策のひとつである。

エムボックスのリスクコミュニケーションとコミュニティアウトリーチ活動として、国立感染症研究所、国立国際医療研究センター、MSM コミュニティセンター、厚生労働省、自治体とで協力し、ガイダンスや疾患啓発文書などを作成、全国の自治体や保健所、医療機関等で活用いただくために公開、配布したほか(参考:[エムボックスの啓発資料](#))、MSM コミュニティや医療従事者などのステークホルダごとに情報発信などの取組を実施している(参

考:[IASR](#))。MSM コミュニティセンターとの対話を維持することで、コミュニティのニーズや優先順位、情報のギャップや誤情報を理解することが可能である。

- **差別や偏見への対策**

エムポックスは誰でも感染するリスクのある感染症である。特定の集団や感染者、感染の疑いのある者等に対する差別や偏見は、人権の侵害につながる。さらに、受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を遅らせる原因となる可能性がある。偏った情報や誤解は差別や偏見を生むため、客観的な情報に基づき、先入観を排した判断と行動がなされるべきである(WHO, 2022d)。

## ワクチンについて

- **WHO は、暫定ガイダンスにおいてエムポックスに対するワクチンとして LC16 ワクチンを含む痘そうワクチンの使用を推奨している。**

痘そう(天然痘)ワクチンは、痘そうウイルスやエムポックスウイルスと同じオルソポックスウイルス属の一つであるワクシニアウイルスをワクチン株として使用したワクチンである。

今回の流行以前の痘そうワクチンのエムポックスに対する知見については、既報([複数国で発生しているエムポックスについて 第5報](#))を参照のこと。

エムポックスの流行を防ぐ手段として、WHO はエムポックス患者の接触者に対する曝露後ワクチン接種(PEPV: Post-exposure Preventive Vaccination)、職業曝露高リスク者、高リスクグループに対しての一次予防(曝露前)ワクチン接種(PPV: Primary preventive vaccination)を推奨している(WHO, 2022b)。

PEPV は、エムポックス患者の濃厚接触者(患者の性的パートナー、同居人、適切な个人防护具を着用せずに患者の皮膚、粘膜、体液、呼吸器飛沫、体液に汚染された物質(寝具など)に触れた可能性のある人)について、発症リスクと重症化予防を目的として、曝露後 14 日以内かつ発症前、理想的には曝露後 4 日以内の接種が推奨されている。PPV は、職業曝露高リスク者(エムポックス患者に接する可能性のある医療従事者、エムポックスウイルスを取り扱うラボ従事者、エムポックス診断を実施する臨床ラボ従事者、アウトブレイク対応チーム)及び高リスクグループ(複数の性的パートナーがいるゲイ・バイセクシュアルその他 MSM を自認する者等)に対して推奨されている(WHO, 2022b)。

今回のエムポックスの流行により、各国から痘そうワクチンのエムポックス予防効果に関する知見が報告されている。米国では、ワクチン未接種者におけるエムポックスの発症は、MVA-BN ワクチン 1 回接種後 14 日経過した者と比較して 7.4 倍(95%信頼区間: 6.0–9.1)、2 回接種後 14 日経過した者と比較して 9.6 倍(95%信頼区間: 6.9–13.2)

高かったとの報告がある(Payne AB, 2022)。また、400人のエムポックス患者のうちMVA-BN ワクチン接種後の症例が90例あり、そのうち69例は14日以内の発症であることから、ワクチン接種前にエムポックスに曝露した可能性が示唆された一方、接種後28日以降に発症したものが8例含まれたと報告された(Hazra A, 2022)。

また、MVA-BN ワクチンの1回接種によるエムポックス感染に対するワクチン効果は、イスラエルから86%、英国から78%、スペインから88.8%と報告されている(Sagy YW, 2022, Bertran M, 2023, Morales LM, 2023)ほか、米国からは1回接種によるワクチン効果が75%、2回接種によるワクチン効果が86%であり、投与経路や免疫不全の程度は影響しなかったと報告している(Dalton AF, 2023)。

有害事象に関する報告として、米国でワクチン有害事象報告システムに登録された、MVA-BN ワクチンを投与された1,350例(18歳未満13例を含む)の報告では、685例(51%)で有害事象が報告された。皮内接種と皮下接種で有害事象の頻度に差はなかったが、皮内接種は膨疹が形成されないなどの手技上の問題がみられた。重篤な有害事象は14例報告され、2例のワクチン接種後の死亡が報告されたが、ワクチンとの関連は不明であった。18歳未満では投与時の失神が1例みられたのみであった(Duffy J, 2022)。

国内でPEPVとしてLC16 ワクチンを使用した特定臨床研究の結果が報告されており、発熱、発疹、リンパ節腫脹などの有害事象はあったものの、接種に関連する重篤な有害事象はなかったと報告された。一方で、接種者全員がエムポックスを発症しなかったものの、参加者数が少なく、予防効果の十分な検討はできなかったと報告している(Tomita N, 2023)ほか、フランスで実施された観察研究では、276人のエムポックス接触者に対してMVA-BNによるPEPVを行い、うち12人で接種後25日までにエムポックス感染がみられたと報告された(Thy M, 2022)。

ただし、PEPVがエムポックスの発症予防にどの程度有効であるかについて、ランダム化比較試験など厳格な臨床試験に基づいた知見は不足しており、ヒトにおけるエムポックスに対するワクチンの有効性の程度や有害事象を明らかにするには、引き続き知見の集積が必要である。

また、感染者の接触者、高リスクグループのいずれについても、当面リスクベネフィットを評価しつつ、本人の希望に応じて、また国内での発生状況に応じて、PEPV、PPVの機会提供が検討されるべきと考えられる。

## 治療薬について

いくつかの抗ウイルス薬について、*in vitro* および動物実験での活性が証明されており、エムポックスの治療に利用できる可能性があるが、エムポックスに対する薬事承認を得ているのは EU におけるテコビリマット (Tecovirimat, ST-246/TPOXX) のみである。テコビリマットは、米国 SIGA Technologies 社が開発した抗ウイルス薬であり、2018 年に米国で経口の抗天然痘薬として承認され、2022 年 5 月に同適応の静注薬として承認された (US FDA, 2018, SIGA, 2022)。また、エムポックスの治療薬としては承認されていないが、食品医薬品局 (FDA) が規定する治験薬への拡大アクセス (Expanded Access to Investigational New Drugs for Treatment Use (EA-IND)) プロトコル下で使用されている。EU では天然痘、ワクシニア症、エムポックス、牛痘に適応がある経口薬として承認された (European Medicines Agency, 2022)。いずれも臨床試験で効果を評価することは困難であることから、非ヒト哺乳類 (サル) を含む複数の動物での致死性チャレンジ試験のデータにより有効性が評価され、使用が承認されている。ヒトに対する知見としては、英国から報告されたヒトでのエムポックスの治療例 1 例では、他の抗ウイルス薬であるブリンシドフォビル (brincidofovir) で治療された 3 例と比較して、症状及び上気道ウイルス排出期間が短く、退院までに有害事象は確認されなかったとする報告 (Adler H, 2022)、米国から 3 例、ドイツから 3 例報告されたヒトでのエムポックスの治療例で、いずれの症例も重症化せず経過し、重篤な有害事象は確認されなかったとする報告 (Matias WR, 2022, Hermaussen L, 2022)、米国から 359 人で安全性評価され、最も多い副作用は頭痛 (10 人に 1 人程度) と吐き気 (最大 10 人に 1 人程度) で後遺症なく回復しているとする報告がある (Grosenbach DW, 2018)。また、ヒトでの第 2 世代天然痘ワクチン接種後の重篤な副反応例に対しての治療目的の使用例があるが (Vora S, 2008, CDC, 2009, Lederman ER, 2012, Whitehouse ER, 2019, Lindholm DA, 2019) 重篤な副作用は見られていない。米国からは EA-IND プロトコル下でテコビリマットを投与された HIV 感染者 254 人を含むエムポックス患者 549 人の報告があり、情報の得られた 369 人のうち、12 人 (3.5%) で頭痛、悪心、視覚障害、衰弱、精神症状などの有害事象がみられた。また、情報の得られた 174 人の自覚症状改善までの期間は、HIV 感染者と非 HIV 感染者で差は見られなかった (O'Laughlin K, 2022)。国内においても、特定臨床研究としてテコビリマットを投与した 2 例について、重篤な副反応や重症化の兆候はなく、速やかな症状の改善とウイルスの消失がみられたことを報告されている (Inada M, 2023)。また、テコビリマットはエムポックスウイルスの膜タンパク質である F13L 遺伝子産物の機能を阻害することで抗ウイルス作用を示すことから、同部位の遺伝子変異によりテコビリマット耐性を獲得することが報告されている (Duraffour S, 2015)。米国から同国内にお

けるテコビルマット耐性エムポックスウイルスの検出状況について、耐性ウイルスが確認できたのは治療を受けた患者全体の1%以下であったが、特に免疫不全を有し長期にテコビルマットを投与された患者でみられたと報告されている(Smith TG, 2023)。

## 動物におけるエムポックス

- サル、げっ歯類などでエムポックスの感染事例の報告があり、ヒトと動物の間でエムポックスウイルスが伝播する可能性がある。

エムポックスは1958年にカニクイザルの疾患として初めて報告された疾患であり、アフリカ大陸中央部から西部においてげっ歯類(ネズミの仲間)が自然界における宿主と考えられている。2003年に、アフリカから輸入されたげっ歯類を介して米国に持ち込まれたエムポックスウイルスが動物取扱業者でプレーリードッグに感染し、さらにヒトに感染させた事例が報告されている(CDC, 2022a)。症状については、サル等の霊長類では、皮疹・粘膜病変、発熱、リンパ節腫脹、呼吸器症状等が見られ、プレーリードッグやげっ歯類では、皮疹・皮膚粘膜病変等の症状が見られる一方で、無症状感染も見られる(CFSPH, 2022)。

英国は今回のエムポックスの流行開始後に実施した、エムポックス確定例が自宅で飼育しているペットに関する調査結果を報告した。それによると、2022年6月から9月の間に40例が飼育している154頭(うちイヌ42頭、ネコ26頭)が観察対象となったが、エムポックスの症状を呈したペットはいなかった(Shepherd W, 2022)。一方で、自宅隔離中のエムポックスの感染者と接触したペットのイヌが感染し、皮膚粘膜病変を発症したとされる事例が報告されているが(Seang S, 2022)、感染していたという証拠は不十分であるという指摘がある(Sykes JE, 2022)。現在まで、イヌからヒトへ感染した事例、ヒトからイヌ以外の他の動物種への感染事例の報告はない。

しかし、多くの動物種がエムポックスウイルスを媒介する可能性があることから、エムポックスの感染者は野生動物やペットとの接触を避けるべきである。なお、CDCやECDCは、エムポックスへの感染を理由にその動物を安楽死させることは推奨していない。

## 注意事項

- 迅速な情報共有を目的とした資料であり、内容や見解は情勢の変化によって変わる可能性がある。



## 謝辞

本文書作成にあたり、国立国際医療研究センター国際感染症センターにご協力をいただきました。この場を借りて感謝申し上げます。

## 参考文献

- Adler, H., Gould, S., Hine, P., Snell, L. B., Wong, W., Houlihan, C. F., Osborne, J. C., Rampling, T., Beadsworth, M. B., Duncan, C. J., Dunning, J., Fletcher, T. E., Hunter, E. R., Jacobs, M., Khoo, S. H., Newsholme, W., Porter, D., Porter, R. J., Ratcliffe, L., Schmid, M. L., ... NHS England High Consequence Infectious Diseases (Airborne) Network (2022). Clinical features and management of human monkeypox: a retrospective observational study in the UK. *The Lancet. Infectious diseases*, 22(8), 1153-1162.
- Antinori, A., Mazzotta, V., Vita, S., Carletti, F., Tacconi, D., Lapini, L. E., D' Abramo, A., Cicalini, S., Lapa, D., Pittalis, S., Puro, V., Rivano Capparuccia, M., Giombini, E., Gruber, C. E. M., Garbuglia, A. R., Marani, A., Vairo, F., Girardi, E., Vaia, F., Nicastri, E., ... INMI Monkeypox Group (2022). Epidemiological, clinical and virological characteristics of four cases of monkeypox support transmission through sexual contact, Italy, May 2022. *Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin*, 27(22), 2200421.
- Badillo-Paulina, R., Juan Carlos, R. A., Lucía Del Carmen, G. F., Sergio, S. R., María Teresa, V. G., Brian Eduardo, P. F., Regina, V. R., Oscar, F. V., Brenda, C. R., & Edgar, P. B. (2023). Mpox-related ophthalmic disease: a retrospective observational study in a single center in Mexico. *The Journal of infectious diseases*, jiad372. Advance online publication. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiad372>.
- Badenoch, J. B., Conti, I., Rengasamy, E. R., Watson, C. J., Butler, M., Hussain, Z., Carter, B., Rooney, A. G., Zandi, M. S., Lewis, G., David, A. S., Houlihan, C. F., Easton, A., Michael, B. D., Kuppalli, K., Nicholson, T. R., Pollak, T. A., & Rogers, J. P. (2022). Neurological and psychiatric presentations associated with human monkeypox virus infection: A systematic review and meta-analysis. *EclinicalMedicine*, 52, 101644.
- Bertran, M., Andrews, N., Davison, C., Dugbazah, B., Boateng, J., Lunt, R., Hardstaff, J., Green, M., Blomquist, P., Turner, C., Mohammed, H., Cordery, R., Mandal, S., Campbell, C., Ladhani, S. N., Ramsay, M., Amirthalingam, G., & Bernal, J. L. (2023). Effectiveness of one dose of MVA-BN smallpox vaccine against



mpox in England using the case-coverage method: an observational study. *The Lancet. Infectious diseases*, 23(7), 828–835. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(23\)00057-9](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(23)00057-9).

- Brosius, I., Van Dijck, C., Coppens, J., Vandenhove, L., Bangwen, E., Vanroye, F., Verschueren, J., ITM MPOX Study Group, Zange, S., Bugert, J., Michiels, J., Bottieau, E., Soentjens, P., van Griensven, J., Kenyon, C., Ariën, K. K., Van Esbroeck, M., Vercauteren, K., & Liesenborghs, L. (2023). Presymptomatic viral shedding in high-risk mpox contacts: A prospective cohort study. *Journal of medical virology*, 95(5), e28769. <https://doi.org/10.1002/jmv.28769>.
- CDC. Monkeypox in Animals. 2022. <https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/veterinarian/monkeypox-in-animals.html>. 2022a.
- CDC. Monkeypox How It Spreads. 2022. <https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/transmission.html>. 2022b.
- CDC. Technical Report 4: Multi-National Monkeypox Outbreak, United States, 2022. <https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/cases-data/technical-report/report-4.html>. 2022c.
- CDC. Progressive vaccinia in a military smallpox vaccinee – United States, 2009. *MMWR*. 2009;58(19):532–536. <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5819a5.htm>.
- CFSPH. Monkeypox Last updated: November 2020, Minor Updates: August 2022. <https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/monkeypox.pdf>.
- China CDC(中国疾病预防控制中心). 猴痘. As of 19 October 2023. [https://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/szkb/13037/gwjszl/13092/202310/t20231016\\_270134.html](https://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/szkb/13037/gwjszl/13092/202310/t20231016_270134.html).
- Colavita, F., Antinori, A., Nicastri, E., Focosi, D., Girardi, E., Vaia, F., & Maggi, F. (2023). Monkeypox virus in human body sites and fluids: evidence for transmission. *The Lancet. Infectious diseases*, 23(1), 6–8.
- Dalton, A. F., Diallo, A. O., Chard, A. N., Moulia, D. L., Deputy, N. P., Fothergill, A., Kracalik, I., Wegner, C. W., Markus, T. M., Pathela, P., Still, W. L., Hawkins, S., Mangla, A. T., Ravi, N., Licherdel, E., Britton, A., Lynfield, R., Sutton, M., Hansen, A. P., Betancourt, G. S., ... CDC Multijurisdictional Mpox Case Control Study Group (2023). Estimated Effectiveness of JYNNEOS Vaccine in Preventing Mpox: A Multijurisdictional Case-Control Study - United States, August 19, 2022-March 31, 2023. *MMWR. Morbidity and mortality weekly report*, 72(20), 553–558. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7220a3>.

- De Baetselier, I., Van Dijck, C., Kenyon, C., Coppens, J., Michiels, J., de Block, T., Smet, H., Coppens, S., Vanroye, F., Bugert, J. J., Giral, P., Zange, S., Liesenborghs, L., Brosius, I., van Griensven, J., Selhorst, P., Florence, E., Van den Bossche, D., Ariën, K. K., Rezende, A. M., ... ITM Monkeypox study group (2022). Retrospective detection of asymptomatic monkeypox virus infections among male sexual health clinic attendees in Belgium. *Nature medicine*, 28(11), 2288–2292.
- Del Giudice, P., Fribourg, A., Roudiere, L., Gillon, J., Decoppet, A., & Reverte, M. (2023). Familial Monkeypox Virus Infection Involving 2 Young Children. *Emerging infectious diseases*, 29(2), 10.3201/eid2902.221674.
- Del Río García, V., Palacios, J. G., Morcillo, A. M., Duran-Pla, E., Rodríguez, B. S., & Lorusso, N. (2022). Monkeypox outbreak in a piercing and tattoo establishment in Spain. *The Lancet. Infectious diseases*, 22(11), 1526–1528.
- Duffy, J., Marquez, P., Moro, P., Weintraub, E., Yu, Y., Boersma, P., Donahue, J. G., Glanz, J. M., Goddard, K., Hambidge, S. J., Lewin, B., Lewis, N., Rouse, D., & Shimabukuro, T. (2022). Safety Monitoring of JYNNEOS Vaccine During the 2022 mpox Outbreak – United States, May 22–October 21, 2022. *MMWR. Morbidity and mortality weekly report*, 71(49), 1555–1559.
- Duraffour, S., Lorenzo, M. M., Zöller, G., Topalis, D., Grosenbach, D., Hruby, D. E., Andrei, G., Blasco, R., Meyer, H., & Snoeck, R. (2015). ST-246 is a key antiviral to inhibit the viral F13L phospholipase, one of the essential proteins for orthopoxvirus wrapping. *The Journal of antimicrobial chemotherapy*, 70(5), 1367–1380. <https://doi.org/10.1093/jac/dku545>.
- ECDC. Risk Assessment: Monkeypox multi-country outbreak. <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-monkeypox-multi-country-outbreak>. 2022a.
- ECDC. Epidemiological update: Monkeypox outbreak. 5-11 June 2022. <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-11-June-2022.pdf>. 2022b.
- ECDC. Monkeypox multi-country outbreak – second update. 18 October 2022. <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/monkeypox-multi-country-outbreak-second-update>. 2022c.
- ECDC. Monkeypox situation update, as of 1 February 2023. <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/monkeypox-situation-update>. 2023.
- European Medicines Agency. Tecovirimat SIGA. First published: January 28,

2022. <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tecovirimat-siga>.

- Fonti, M., Mader, T., Burmester-Kiang, J., Aberle, S. W., Horvath-Mechtler, B., Traugott, M., Laferl, H., Zoufaly, A., Wensch, C., Erlacher, L., & Hoepfer, W. (2022). Monkeypox associated acute arthritis. *The Lancet. Rheumatology*, 4(11), e804.
- Grosecorn, D. W., Honeychurch, K., Rose, E. A., Chinsangaram, J., Frimm, A., Maiti, B., Lovejoy, C., Meara, I., Long, P., & Hruby, D. E. (2018). Oral Tecovirimat for the Treatment of Smallpox. *The New England journal of medicine*, 379(1), 44-53.
- Hammerschlag, Y., MacLeod, G., Papadakis, G., Adan Sanchez, A., Druce, J., Taiaroa, G., Savic, I., Mumford, J., Roberts, J., Caly, L., Friedman, D., Williamson, D. A., Cheng, A. C., & McMahon, J. H. (2022). Monkeypox infection presenting as genital rash, Australia, May 2022. *Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin*, 27(22), 2200411.
- Hazra, A., Rusie, L., Hedberg, T., & Schneider, J. A. (2022). Human Monkeypox Virus Infection in the Immediate Period After Receiving Modified Vaccinia Ankara Vaccine. *JAMA*, 328(20), 2064-2067.
- Hermanussen, L., Grewe, I., Tang, H. T., Nörz, D., Bal, L. C., Pfefferle, S., Unger, S., Hoffmann, C., Berzow, D., Kohsar, M., Aepfelbacher, M., Lohse, A. W., Addo, M. M., Lütgehetmann, M., Schulze Zur Wiesch, J., & Schmiedel, S. (2023). Tecovirimat therapy for severe monkeypox infection: Longitudinal assessment of viral titers and clinical response pattern-A first case-series experience. *Journal of medical virology*, 95(1), e28181.
- Inada, M., Saito, S., Tsuzuki, S., Okumura, N., Sato, L., Kamegai, K., Sanada, M., Komatsubara, M., Shimojima, M., Ebihara, H., Kasuya, F., Nagashima, M., Sadamasu, K., Yamamoto, K., Ujiie, M., Morioka, S., & Ohmagari, N. (2023). Treatment with tecovirimat of the first two cases of monkeypox in Japan. *Journal of infection and chemotherapy : official journal of the Japan Society of Chemotherapy*, S1341-321X(23)00019-3. Advance online publication.
- Isidro, J., Borges, V., Pinto, M., Sobral, D., Santos, J. D., Nunes, A., Mixão, V., Ferreira, R., Santos, D., Duarte, S., Vieira, L., Borrego, M. J., Nuncio, S., de Carvalho, I. L., Pelerito, A., Cordeiro, R., & Gomes, J. P. (2022). Phylogenomic characterization and signs of microevolution in the 2022 multi-country outbreak of monkeypox virus. *Nature medicine*, 28(8), 1569-1572.
- KCDA(질병관리청). 국내발생현황. As of 19 October 2023.

<https://www.kdca.go.kr/contents.es?mid=a20108080000>.

- Keckler, M. S., Reynolds, M. G., Damon, I. K., & Karem, K. L. (2013). The effects of post-exposure smallpox vaccination on clinical disease presentation: addressing the data gaps between historical epidemiology and modern surrogate model data. *Vaccine*, 31(45), 5192–5201.
- KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. INFEKSI EMERGING. Indonesia Melaporkan 14 Kasus Konfirmasi Mpox. 26 October 2023. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/penyakit-virus/indonesia-melaporkan-14-kasus-konfirmasi-mpox>.
- Kubo, T., Hayakawa, K., Akiyama, Y., Morioka, S., & Ohmagari, N. (2023). A case of confirmed pre-symptomatic transmission of mpox. *Journal of infection and chemotherapy : official journal of the Japan Society of Chemotherapy*, 29(10), 1008–1009. <https://doi.org/10.1016/j.jiac.2023.06.018>.
- Lapa, D., Carletti, F., Mazzotta, V., Matusali, G., Pinnetti, C., Meschi, S., Gagliardini, R., Colavita, F., Mondì, A., Minosse, C., Scorzolini, L., Cicalini, S., Maffongelli, G., Specchiarello, E., Camici, M., Bettini, A., Baldini, F., Francalancia, M., Mizzoni, K., Garbuglia, A. R., ... INMI Monkeypox Study Group (2022). Monkeypox virus isolation from a semen sample collected in the early phase of infection in a patient with prolonged seminal viral shedding. *The Lancet. Infectious diseases*, 22(9), 1267–1269.
- Lederman, E. R., Davidson, W., Groff, H. L., Smith, S. K., Warkentien, T., Li, Y., Wilkins, K. A., Karem, K. L., Akondy, R. S., Ahmed, R., Frace, M., Shieh, W. J., Zaki, S., Hruby, D. E., Painter, W. P., Bergman, K. L., Cohen, J. I., & Damon, I. K. (2012). Progressive vaccinia: case description and laboratory-guided therapy with vaccinia immune globulin, ST-246, and CMX001. *The Journal of infectious diseases*, 206(9), 1372–1385.
- Lindholm, D. A., Fisher, R. D., Montgomery, J. R., Davidson, W., Yu, P. A., Yu, Y. C., Burgado, J., Wilkins, K., Petersen, B. W., & Okulicz, J. F. (2019). Preemptive Tecovirimat Use in an Active Duty Service Member Who Presented With Acute Myeloid Leukemia After Smallpox Vaccination. *Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America*, 69(12), 2205–2207.
- Matias, W. R., Koshy, J. M., Nagami, E. H., Kovac, V., Moeng, L. R., Shenoy, E. S., Hooper, D. C., Madoff, L. C., Barshak, M. B., Johnson, J. A., Rowley, C. F., Julg, B., Hohmann, E. L., & Lazarus, J. E. (2022). Tecovirimat for the Treatment of Human Monkeypox: An Initial Series From Massachusetts, United States. *Open forum*

infectious diseases, 9(8), ofac377.

- Miller, M. J., Cash-Goldwasser, S., Marx, G. E., Schrodtt, C. A., Kimball, A., Padgett, K., Noe, R. S., McCormick, D. W., Wong, J. M., Labuda, S. M., Borah, B. F., Zulu, I., Asif, A., Kaur, G., McNicholl, J. M., Kourtis, A., Tadros, A., Reagan-Steiner, S., Ritter, J. M., Yu, Y., ... CDC Severe Monkeypox Investigations Team (2022). Severe Monkeypox in Hospitalized Patients - United States, August 10-October 10, 2022. *MMWR. Morbidity and mortality weekly report*, 71(44), 1412-1417.
- Mizushima, D., Shintani, Y., Takano, M., Shiojiri, D., Ando, N., Aoki, T., Watanabe, K., Nakamoto, T., Gatanaga, H., & Oka, S. (2023). Prevalence of Asymptomatic Mpox among Men Who Have Sex with Men, Japan, January-March 2023. *Emerging infectious diseases*, 29(9), 1872-1876. <https://doi.org/10.3201/eid2909.230541>.
- Montero Morales, L., Barbas Del Buey, J. F., Alonso García, M., Cenamor Largo, N., Nieto Juliá, A., Vázquez Torres, M. C., Jiménez Bueno, S., Aragón Peña, A., Gil Montalbán, E., Íñigo Martínez, J., Alonso Colón, M., Arce Arnáez, A., & Madrid Surveillance Network and Vaccination Centre of Madrid Region (2023). Post-exposure vaccine effectiveness and contact management in the mpox outbreak, Madrid, Spain, May to August 2022. *Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin*, 28(24), 2200883. <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2023.28.24.2200883>.
- Nemechek, K., Stefanos, R., Miller, E. L., Riser, A., Kebede, B., Galang, R. R., Hufstetler, K., Descamps, D., Balenger, A., Hennessee, I., Neelam, V., Hutchins, H. J., Labuda, S. M., Davis, K. M., McCormick, D. W., Marx, G. E., Kimball, A., Ruberto, I., Williamson, T., Rzucidlo, P., ... Pao, L. Z. (2023). Notes from the Field: Exposures to Mpox Among Cases in Children Aged ≤12 Years - United States, September 25-December 31, 2022. *MMWR. Morbidity and mortality weekly report*, 72(23), 633-635. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7223a4>.
- Nextstrain. Genomic epidemiology of monkeypox virus. <https://nextstrain.org/monkeypox>
- O’Laughlin, K., Tobolowsky, F. A., Elmor, R., Overton, J., O’Connor, S. M., Damon, I. K., Petersen, B. W., Rao, A. K., Chatham-Stephens, K., Yu, P., Yu, Y., & CDC Monkeypox Tecovirimat Data Abstraction Team (2022). Clinical Use of Tecovirimat (Tpoxx) for Treatment of Monkeypox Under an Investigational New Drug Protocol - United States, May-August 2022. *MMWR. Morbidity and mortality weekly report*, 71(37), 1190-1195.
- Payne, A. B., Ray, L. C., Cole, M. M., Canning, M., Houck, K., Shah, H. J., Farrar, J.

L., Lewis, N. M., Fothergill, A., White, E. B., Feldstein, L. R., Roper, L. E., Lee, F., Kriss, J. L., Sims, E., Spicknall, I. H., Nakazawa, Y., Gundlapalli, A. V., Shimabukuro, T., Cohen, A. L., ... Payne, D. C. (2022). Reduced Risk for mpox After Receipt of 1 or 2 Doses of JYNNEOS Vaccine Compared with Risk Among Unvaccinated Persons - 43 U.S. Jurisdictions, July 31-October 1, 2022. *MMWR. Morbidity and mortality weekly report*, 71(49), 1560-1564.

- Pettke, A., Filén, F., Widgren, K., Jacks, A., Glans, H., Andreasson, S., Muradrasoli, S., Helgesson, S., Hauzenberger, E., Karlberg, M. L., Walai, N., Bjerkner, A., Gourlé, H., Gredmark-Russ, S., Lindsjö, O. K., Sondén, K., & Asgeirsson, H. (2022). Ten-Week Follow-Up of Monkeypox Case-Patient, Sweden, 2022. *Emerging infectious diseases*, 28(10), 2074-2077.
- Perez Duque, M., Ribeiro, S., Martins, J. V., Casaca, P., Leite, P. P., Tavares, M., Mansinho, K., Duque, L. M., Fernandes, C., Cordeiro, R., Borrego, M. J., Pelerito, A., de Carvalho, I. L., Núncio, S., Manageiro, V., Minetti, C., Machado, J., Haussig, J. M., Croci, R., Spiteri, G., ... Freitas, G. (2022). Ongoing monkeypox virus outbreak, Portugal, 29 April to 23 May 2022. *Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin*, 27(22), 2200424.
- Pinnetti, C., Cimini, E., Mazzotta, V., Matusali, G., Vergori, A., Mondì, A., Rueca, M., Batzella, S., Tartaglia, E., Bettini, A., Notari, S., Rubino, M., Tempestilli, M., Pareo, C., Falasca, L., Del Nonno, F., Scarabello, A., Camici, M., Gagliardini, R., Girardi, E., ... Antinori, A. (2023). Mpox as AIDS-defining event with a severe and protracted course: clinical, immunological, and virological implications. *The Lancet. Infectious diseases*, S1473-3099(23)00482-6. Advance online publication. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(23\)00482-6](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(23)00482-6).
- Rodriguez-Nava, G., Kadlecik, P., Filardo, T. D., Ain, D. L., Cooper, J. D., McCormick, D. W., Webber, B. '., O'Laughlin, K., Petersen, B. W., Narasimhan, S., & Sahni, H. K. (2022). Myocarditis Attributable to Monkeypox Virus Infection in 2 Patients, United States, 2022. *Emerging infectious diseases*, 28(12), 2508-2512.
- Salvato, R. S., Rodrigues Ikeda, M. L., Barcellos, R. B., Godinho, F. M., Sesterheim, P., Bitencourt, L. C. B., Gregianini, T. S., Gorini da Veiga, A. B., Spilki, F. R., & Wallau, G. L. (2022). Possible Occupational Infection of Healthcare Workers with Monkeypox Virus, Brazil. *Emerging infectious diseases*, 28(12), 2520-2523.
- Seang, S., Burrell, S., Todesco, E., Leducq, V., Monsel, G., Le Pluart, D., Cordevant, C., Pourcher, V., & Palich, R. (2022). Evidence of human-to-dog transmission of

- monkeypox virus. *Lancet* (London, England), 400(10353), 658–659.
- Shepherd, W., Beard, P. M., Brookes, S. M., Frost, A., Roberts, H., Russell, K., & Wyllie, S. (2022). The risk of reverse zoonotic transmission to pet animals during the current global monkeypox outbreak, United Kingdom, June to mid-September 2022. *Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin*, 27(39), 2200758.
  - SIGA. SIGA receives approval from the FDA for intravenous (IV) formulation of TPOXX® (tecovirimat). 2022. <https://investor.siga.com/news-releases/news-release-details/siga-receives-approval-fda-intravenous-iv-formulation-tpoxxr>.
  - Sykes J. E. (2022). A call for more evidence documenting human-to-dog transmission of monkeypox virus. *Lancet* (London, England), 400(10357), 993.
  - Smith, T. G., Gigante, C. M., Wynn, N. T., Matheny, A., Davidson, W., Yang, Y., Condori, R. E., O’Connell, K., Kovar, L., Williams, T. L., Yu, Y. C., Petersen, B. W., Baird, N., Lowe, D., Li, Y., Satheshkumar, P. S., & Hutson, C. L. (2023). Tecovirimat Resistance in Mpox Patients, United States, 2022–2023. *Emerging infectious diseases*, 29(12), 10.3201/eid2912.231146. Advance online publication. <https://doi.org/10.3201/eid2912.231146>.
  - Suñer, C., Ubals, M., Tarín-Vicente, E. J., Mendoza, A., Alemany, A., Hernández-Rodríguez, Á., Casañ, C., Descalzo, V., Ouchi, D., Marc, A., Rivero, À., Coll, P., Oller, X., Miguel Cabrera, J., Vall-Mayans, M., Dolores Folgueira, M., Ángeles Melendez, M., Agud-Dios, M., Gil-Cruz, E., Paris de Leon, A., ... Mitjà, O. (2022). Viral dynamics in patients with monkeypox infection: a prospective cohort study in Spain. *The Lancet. Infectious diseases*, S1473-3099(22)00794-0. Advance online publication.
  - Taylor L. (2022). Monkeypox: WHO to rename disease to prevent stigma. *BMJ* (Clinical research ed.), 377, o1489.
  - Thailand Ministry of Public Health. รายงานสถานการณ์โรคติดต่อฝีดาษวานร (Mpox). As of 1 November 2023. <https://ddc.moph.go.th/monkeypox/dashboard.php>. 2023a.
  - Thailand Ministry of Public Health. กรมควบคุมโรค ย้ำผู้ติดเชื้อเอชไอวี งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า ป้องกันโรคฝีดาษวานร ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หากสงสัยป่วยรีบพบแพทย์ตรวจรักษา. Published on 30 October 2023. <https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=38043&deptcode=brc>. 2023b.
  - Thornhill, J. P., Barkati, S., Walmsley, S., Rockstroh, J., Antinori, A., Harrison, L. B., Palich, R., Nori, A., Reeves, I., Habibi, M. S., Apea, V., Boesecke, C., Vandekerckhove, L., Yakubovsky, M., Sendagorta, E., Blanco, J. L., Florence, E., Moschese, D., Maltez, F. M., Goorhuis, A., ... SHARE-net Clinical Group (2022).



Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries - April-June 2022. The New England journal of medicine, 387(8), 679–691.

- Thy, M., Peiffer-Smadja, N., Mailhe, M., Kramer, L., Ferré, V. M., Houhou, N., Tarhini, H., Bertin, C., Beaumont, A. L., Garé, M., Le Pluart, D., Perrineau, S., Rahi, M., Deconinck, L., Phung, B., Mollo, B., Cortier, M., Cresta, M., De La Porte Des Vaux, C., Joly, V., ... Ghosn, J. (2022). Breakthrough Infections after Postexposure Vaccination against mpox. The New England journal of medicine, 387(26), 2477–2479.
- Tomita, N., Terada-Hirashima, J., Uemura, Y., Shimizu, Y., Iwasaki, H., Yano, R., Suzuki, T., Saito, S., Okumura, N., Sugiura, W., Ohmagari, N., & Ujiie, M. (2023). An open-label, non-randomized study investigating the safety and efficacy of smallpox vaccine, LC16, as post-exposure prophylaxis for mpox. Human vaccines & immunotherapeutics, 19(2), 2242219.  
<https://doi.org/10.1080/21645515.2023.2242219>.
- UKHSA. Monkeypox cases confirmed in England – latest updates.  
<https://www.gov.uk/government/news/monkeypox-cases-confirmed-in-england-latest-updates>. 2022.
- US FDA. FDA approves the first drug with an indication for treatment of smallpox. 2018. <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-indication-treatment-smallpox>.
- Tutu van Furth, A. M., van der Kuip, M., van Els, A. L., Fievez, L. C., van Rijckevorsel, G. G., van den Ouden, A., Jonges, M., & Welkers, M. R. (2022). Paediatric monkeypox patient with unknown source of infection, the Netherlands, June 2022. Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 27(29), 2200552.
- Vietnam Ministry of Health. Cập nhật tình hình dịch bệnh đậu mùa khi. Published on 11 October 2023. <https://vncdc.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh-dau-mau-khi-va-cac-hoat-dong-phong-chong-dich-nd17404.html>.
- Vivancos, R., Anderson, C., Blomquist, P., Balasegaram, S., Bell, A., Bishop, L., Brown, C. S., Chow, Y., Edeghere, O., Florence, I., Logan, S., Manley, P., Crowe, W., McAuley, A., Shankar, A. G., Mora-Peris, B., Paranthaman, K., Prochazka, M., Ryan, C., Simons, D., ... Monkeypox Incident Management Team (2022). Community transmission of monkeypox in the United Kingdom, April to May 2022. Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 27(22), 2200422.
- Vivancos-Gallego, M. J., Sánchez-Conde, M., Rodríguez-Domínguez, M.,



- Fernandez-Gonzalez, P., Martínez-García, L., Garcia-Mouronte, E., Martínez-Sanz, J., Moreno-Zamora, A. M., Casado, J. L., Ron, R., Galán, J. C., Pérez-Elías, M. J., & Moreno, S. (2022). Human Monkeypox in People With HIV: Transmission, Clinical Features, and Outcome. *Open forum infectious diseases*, 9(11), ofac557.
- Vora, S., Damon, I., Fulginiti, V., Weber, S. G., Kahana, M., Stein, S. L., Gerber, S. I., Garcia-Houchins, S., Lederman, E., Hruby, D., Collins, L., Scott, D., Thompson, K., Barson, J. V., Regnery, R., Hughes, C., Daum, R. S., Li, Y., Zhao, H., Smith, S., ... Marcinak, J. (2008). Severe eczema vaccinatum in a household contact of a smallpox vaccinee. *Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America*, 46(10), 1555–1561.
  - Ward, T., Christie, R., Paton, R. S., Cumming, F., & Overton, C. E. (2022). Transmission dynamics of monkeypox in the United Kingdom: contact tracing study. *BMJ (Clinical research ed.)*, 379, e073153.
  - Whitehouse, E. R., Rao, A. K., Yu, Y. C., Yu, P. A., Griffin, M., Gorman, S., Angel, K. A., McDonald, E. C., Manlutac, A. L., de Perio, M. A., McCollum, A. M., Davidson, W., Wilkins, K., Ortega, E., Satheshkumar, P. S., Townsend, M. B., Isakari, M., & Petersen, B. W. (2019). Novel Treatment of a Vaccinia Virus Infection from an Occupational Needlestick - San Diego, California, 2019. *MMWR. Morbidity and mortality weekly report*, 68(42), 943–946.
  - WHO. Second meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR) Emergency Committee regarding the multi-country outbreak of monkeypox. [https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-\(ihr\)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox](https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox). 2022a.
  - WHO. Vaccines and immunization for monkeypox: Interim guidance, 16 November 2022. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-Immunization>. 2022b.
  - WHO. Monkeypox: experts give virus variants new names. <https://www.who.int/news/item/12-08-2022-monkeypox--experts-give-virus-variants-new-names>. 2022c.
  - WHO. Risk communications and community engagement public health advice on understanding, preventing and addressing stigma and discrimination related to monkeypox. <https://www.who.int/publications/m/item/communications-and-community-engagement-interim-guidance-on-using-inclusive-language-in-understanding--preventing-and-addressing-stigma-and-discrimination-related-to-monkeypox>. 2022d.
  - WHO. Vaccines and immunization for monkeypox: Interim guidance, 16 November

2022. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-Immunization-2022.2-eng>. 2022e.

- WHO. WHO recommends new name of monkeypox disease. <https://www.who.int/news/item/28-11-2022-who-recommends-new-name-for-monkeypox-disease>. 2022f.
- WHO. 2022 Monkeypox Outbreak: Global Trends, produced 18 October 2023. As of 19 October 2023. [https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx\\_global/](https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/). 2023a.
- WHO. Fifth meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR) Emergency Committee on the Multi-Country Outbreak of monkeypox (mpox). [https://www.who.int/news/item/11-05-2023-fifth-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-\(ihr\)-emergency-committee-on-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox-\(mpox\)](https://www.who.int/news/item/11-05-2023-fifth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-committee-on-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox-(mpox)). 2023b.
- WHO. Standing recommendations for mpox issued by the Director-General of the World Health Organization (WHO) in accordance with the International Health Regulations (2005) (IHR). [https://www.who.int/publications/m/item/standing-recommendations-for-mpox-issued-by-the-director-general-of-the-world-health-organization-\(who\)-in-accordance-with-the-international-health-regulations-\(2005\)-\(ihr\)](https://www.who.int/publications/m/item/standing-recommendations-for-mpox-issued-by-the-director-general-of-the-world-health-organization-(who)-in-accordance-with-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)). 2023c.
- Wolff Sagy, Y., Zucker, R., Hammerman, A., Markovits, H., Ariei, N. G., Abu Ahmad, W., Battat, E., Ramot, N., Carmeli, G., Mark-Amir, A., Wagner-Kolasko, G., Duskin-Bitan, H., Yaron, S., Peretz, A., Arbel, R., Lavie, G., & Netzer, D. (2023). Real-world effectiveness of a single dose of mpox vaccine in males. *Nature medicine*, 1–5. Advance online publication.
- Zhang, X. S., Mandal, S., Mohammed, H., Turner, C., Florence, I., Walker, J., Niyomsri, S., Amirthalingam, G., Ramsay, M., Charlett, A., & Vickerman, P. (2023). Transmission dynamics and effect of control measures on the 2022 outbreak of mpox among gay, bisexual, and other men who have sex with men in England: a mathematical modelling study. *The Lancet. Infectious diseases*, S1473-3099(23)00451-6. Advance online publication. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(23\)00451-6](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(23)00451-6).
- 厚生労働省. エムポックスについて. [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/monkeypox\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html). 2022a.
- 厚生労働省. 令和 4 年 8 月 10 日付厚生労働省健康局結核感染症課長通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1 項及び第 14 条第 2 項に基づく届出の基準等について」. <https://www.mhlw.go.jp/content/000975379.pdf>. 2022b.

- 厚生労働省. 薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会令和4年度第2回安全技術調査会資料. (2022年8月22日). [https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_27504.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27504.html). 2022c.
- 厚生労働省. 令和4年5月20日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「[エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について](#)」令和5年5月26日最終改正. 2023a.
- 厚生労働省. 第72回厚生科学審議会感染症部会資料. [https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_31045.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html). 2023b.
- 国立国際医療研究センター国際感染症センター. [エムポックス\(Mpox\)の診療指針 ver. 2.1](#).
- 国立感染症研究所. [エムポックスとは](#). (2022年5月20日更新). 2022.
- 国立感染症研究所. [感染症発生動向調査週報 2023年](#). 2023.
- 国立感染症研究所・国立国際医療研究センター国際感染症センター(DCC) [エムポックス患者とエムポックス疑い例への感染予防策](#). 2022.
- 日本赤十字社. 更新)献血におけるエムポックスウイルス感染症への対応について. 2022年8月19日. [https://www.jrc.or.jp/donation/blood/news/2022/0729\\_027529.html](https://www.jrc.or.jp/donation/blood/news/2022/0729_027529.html).

## 関連項目

- 国立感染症研究所 [エムポックス](#)

## 更新履歴

第6報 2023/11/8 時点

2023/5/26 政令改正に伴い、「サル痘」から「エムポックス」に名称変更

第5報 2023/5/10 時点 注)第4報からタイトル変更

「複数国で報告されているエムポックスについて」

第4報 2022/11/9 時点

第3報 2022/9/13 時点

第2報 2022/7/12 時点 注)第1報からタイトル変更

「複数国で報告されているエムポックスについて」

第1報 2022/5/24 時点

「アフリカ大陸以外の複数国で報告されているエムポックスについて」